

PARDIÑAS Y CENIZO 2023- FIGURAS SUPLEMENTARIAS



Fig. S1. Trabajos de campo efectuados en Centinela del Mar (septiembre, 2021). **1,** Relevamientos de cuevas sobre el frente acantilado, previa remoción de la cobertura vegetal de exóticas. **2–3,** Tamizado de sedimentos depositados sobre plataformas de erosión.



Fig. S2. Diagrama esquemático patrón para la evaluación de fracturas sobre material esquelético de pequeños mamíferos (solo se ejemplifica con tres huesos, desde arriba hacia abajo: fémur, tibia e innominado).




Fig. S3. *Tyto furcata* (CNP-E 904), extremo distal de tarsometatarso izquierdo en vista dorsal (1) y plantar (2). 3, *Cornu* sp. (CNP-E 902), conchilla en vista dorsal. Escala = 5 mm.



Fig. S4. Dos ejemplares de *Tyto furcata* fotografiados en el interior de una cueva del acantilado costero de Centinela del Mar. Imagen obtenida por M. Cenizo (año 2010).



Fig. S5. Aspecto de un relleno de cueva (identificada por el mango rojo que asoma), excavada a expensas del “Centinelense”, en planta. Esta foto, tomada en 1996, corresponde a las exposiciones sedimentarias ubicadas unos 500 metros al Sur del hotel abandonado de Centinela del Mar.




Fig. S6. Dibujos esquemáticos de hemimandíbulas derechas de *Necromys* en vista labial: desde arriba hacia abajo, *Necromys obscurus scagliarum*, *Necromys obscurus obscurus* y *Necromys lasiurus*; cada figurita guarda relación de escala entre sí para poner en evidencia las diferencias de tamaños. Dibujo original de Maximiliano Lezcano, sombreado digitalmente.




Fig. S7. Análisis de rarificación de las muestras de restos de micromamíferos del intervalo Holoceno Tardío–Antropoceno de Centinela del Mar (Buenos Aires).



Fig. S8. Foto satelital falso color con epicentro en el hotel abandonado de Centinela del Mar y radio aproximado de 2 km en torno a este punto (obtenida de Google Earth). Nótese la dominancia de ambientes antropogénicos (e.g., campos de cultivo, forestaciones).