

**Claves dicotómicas del trabajo:**

**UNITE AL JUEGO: CLAVES PARA IDENTIFICAR ANUROS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO  
DE ARGENTINA CON APENAS UN HUESO**

**(HOP ON THE GAME: IDENTIFICATION KEYS TO MEDIUM- TO LARGE-SIZED ANURANS  
OF ARGENTINA USING JUST ONE BONE)**

GIULIANO SERGIO CRUDO, GUILLERMO FIDEL TURAZZINI, RAÚL ORENCIO GÓMEZ\*

*\*raulorenciogomez@gmail.com*

Parte 3: Ilión

**TABLA S6. Claves dicotómicas para la identificación de anuros de mediano y gran tamaño de Argentina usando huesos aislados de la columna vertebral. Cuando un paso de la clave involucra múltiples caracteres, es suficiente con evaluar uno de ellos para pasar al siguiente paso.**

**Ilión**

Figuras 2, 5

|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Articulación interilíaca ósea muy amplia; expansiones acetabulares dorsal y ventral dirigidas medialmente, fosa acetabular ocupando casi todo el cuerpo ilíaco en vista acetabular. Pipidae ..... | 2                                                                |
| -  | Articulación interiliaca ósea escasa o nula; expansiones acetabulares ventral y dorsal bien expuestas en vista acetabular. Neobatrachia .....                                                     | 3                                                                |
| 2. | Prominencia dorsal baja, casi simétrica en vista acetabular; cresta dorsal más amplia en la mitad de su largo, orientada lateralmente .....                                                       | <i>Pipa</i>                                                      |
| -  | Prominencia dorsal alta, asimétrica; cresta dorsal baja, limitada a la mitad anterior de la rama ilíaca, orientada más dorsalmente .....                                                          | <i>Xenopus</i>                                                   |
| 3. | Prominencia dorsal triangular; expansión acetabular dorsal alta; rama ilíaca apenas curvada; cresta dorsal ausente o muy baja .....                                                               | 4                                                                |
| -  | Prominencia dorsal baja o confluyendo con una cresta dorsal; rama ilíaca bien curvada; cresta dorsal variable .....                                                                               | 5                                                                |
| 4. | Expansión acetabular dorsal puntuda, más alta que la fosa acetabular .....                                                                                                                        | <i>Odontophrynus</i>                                             |
| -  | Expansión acetabular triangular, a lo sumo, alta como la fosa acetabular .....                                                                                                                    | Ceratophryidae                                                   |
| 5. | Ángulo VSA amplio ( $> 90^\circ$ ); expansión acetabular dorsal fuerte posterodorsalmente; protuberancia dorsal como pliegue; cresta dorsal alta, margen arqueado .....                           | <i>Calyptocephalella</i>                                         |
| -  | VSA recto o agudo ( $\leq 90^\circ$ ); expansión acetabular dorsal más pequeña, más medialmente; protuberancia y cresta dorsal variables, pero diferentes a lo anterior .....                     | 6                                                                |
| 6. | Cresta dorsal alta de margen recto o curvado ventralmente; expansión acetabular ventral amplia; VSA agudo ( $< 90^\circ$ ); protuberancia dorsal grande, lisa .....                               | <i>Leptodactylus</i>                                             |
| -  | Cresta dorsal poco notoria; expansión acetabular ventral moderadamente amplia, delimitando un VSA recto (alrededor de $90^\circ$ ); protuberancia dorsal pequeña, rugosa .....                    | 7                                                                |
| 7. | Prominencia dorsal posterior al nivel del margen acetabular anterior; lámina calamita ausente .....                                                                                               | <i>Rhinella</i> : Gr. <i>R. granulosa</i>                        |
| -  | Prominencia dorsal más anterior; lámina calamita presente .....                                                                                                                                   | <i>Rhinella</i> : Gr. <i>R. marina</i> , Gr. <i>R. spinulosa</i> |